

# 予防接種説明書綴



## 予防接種について

感染症の中には、かかると重症化したり、後遺症が残ったり、時には命にかかわる病気もあります。予防接種の目的は、病気にかかるのを防いだり、かかったとしても症状が軽く済むようにすることです。積極的に予防接種を受けて病気を予防しましょう。

\*なお、転出されると多度津町の予診票は使えませんので、転出先の市町村へお問い合わせください。

### [予防接種を受けに行く前に]

- ・ 「予防接種とこどもの健康」や説明書等をよく読んで理解した上で受けましょう。不明な点は、接種を受ける医師または、健康福祉課へお問い合わせください。
- ・ 当日の状態をよく観察し、予診票は責任を持って記入してください。体調が悪ければ延期し、体調の良い時に受けましょう。
- ・ 受けるお子さんの日頃の状態がよくわかる保護者が連れて行きましょう。
- ・ 体温は、接種に出かける前と、接種場所（医療機関）で測ってください。
- ・ 予診の結果、接種可能であれば、医師の説明をよく聞いた後、接種に連れて行っている人のサインをしてください。

### [予防接種を受けた後]

- ・ 接種後30分間は、接種場所（医療機関）で子どもの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
- ・ 入浴はさしつかえありませんが、接種部位をこすったり、激しい運動や特に疲れるようなことはやめましょう。
- ・ 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

### [対象者および接種場所]

- ・ 別表の対象年齢（2～3ページ）、医療機関（4ページ）を参考にしてください。

### [受け方]

- ・ 多度津町が委託している指定医療機関で受けてください。電話予約が必要です。予診票は、接種可能月齢ごろに、町より個別通知します。
- ・ 料金は、無料です。ただし、対象年齢以外で接種される場合は、全額自費になります。
- ・ 接種当日、多度津町に住民票がないお子さんは受けられません。

### [持っていくもの]

予診票・母子健康手帳・健康保険証

他の予防接種との間隔を確認するため、必ず母子健康手帳を持参してください。

予診票がない場合は、健康福祉課まで連絡してください。

## 予防接種の受け方



予 防 接 種		対 象 年 齢	受 け 方	予 診 票 送 付 の 時 期
ロタウイルス	ロタリックス（1価）は2回	生後6週0日（標準的には2か月）から接種開始 経口ワクチンで2種類のワクチンがあり * <b>腸重積症の既往、未治療の先天性消化管障害のある者は接種不可</b> * <u>1回目は14週6日までに接種する</u> * ワクチンの種類により接種回数と接種期間が異なる 原則、同じワクチンで接種を完了する ・ロタリックス（1価）：27日以上の間隔をあけて24週0日までに2回目を接種 ・ロタテック（5価）：27日以上の間隔をあけて32週0日までに3回目まで接種		
	ロタテック（5価）は3回			
小児用肺炎球菌	初回（3回）	生後2か月～5歳の誕生日の前日までの間にある者 標準的な接種開始：生後2～7か月未満 * 接種開始月齢により接種回数が異なる	2歳（標準的には1歳）までに27日以上の間隔をおいて3回	生後2か月に なる前
	追加（1回）	・生後6か月までに接種開始した場合は接種回数が4回 ・生後7か月以上で接種開始した場合は接種回数が1～3回 * 接種スケジュールを大幅にはずれてしまった場合は、接種回数・間隔も変更になる場合あり	初回終了後60日以上の間隔をおいて1歳以上（標準的には1歳から1歳2か月）で1回	
B型肝炎	1回目 2回目 3回目	1歳の誕生日の前日までの間にある者 標準的な接種期間： 生後2か月～8か月の者	27日以上の間隔で2回、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目	
5種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ ヒブ)	1期初回（3回）	生後2か月～7歳6か月に至るまでの間にある者 標準的な接種期間：生後2か月になれば早めに接種を開始し、生後7か月に至るまでに初回接種を終了 6月～18月あけて追加接種	20日以上（標準的には20～56日）の間隔をおいて3回	
	1期追加（1回）		初回3回終了後6月以上、標準的には6月～18月の間隔をおいて1回	
BCG	1歳の誕生日の前日までの間にある者 標準的な接種期間：生後5か月～7か月の者		1回	

予 防 接 種		対 象 年 齢	受 け 方	予 診 票 送 付 の 時 期
水痘 (水ぼうそう)	1回目 2回目	1歳～3歳の誕生日の前日までの間に ある者	1歳～1歳3か月に至るま でに1回目、3月以上(標準的 には6～12月)の間隔をおいて 2回目	1歳に なる前
麻しん風しん混合 (MR)	1期	1歳～2歳の誕生日の前日までの間に ある者(1歳になれば早めに受ける)	1回	年長児の 4月
	2期	5歳以上7歳未満で小学校就学前の 1年間(幼稚園、保育所等の年長児)	1回	
日本脳炎	1期初回 (2回)	生後6か月～7歳6か月に至るま での間にある者	6日以上(標準的には6～28 日)の間隔をおいて2回	3歳に なる前月
	1期追加 (1回)	標準的な接種年齢: 3歳で初回接種 4歳で追加接種	1期初回終了後6月以上、標準 的にはおおむね1年後に1回	
	2期	9歳以上13歳未満 標準的な接種年齢: 9歳	1回	9歳に なった翌月
二種混合(DT) 〔ジフテリア 破傷風〕	2期 (1回)	11歳以上13歳未満 標準的な接種年齢: 11歳	1回	11歳に なった翌月
子宮頸がん	1回目 2回目 (3回目)	小学校6年生(12歳相当)～ 高校1年生(16歳相当)の女子 標準的な接種期間: 中学校1年生(13歳相当)の女子	・【2回接種】 15歳未満で9価ワ クチンを接種する場合は、6か月の間 隔で2回 ・【3回接種】 1回目接種後、ワ クチンの種類により1か月後、または2 か月後に2回目、6か月後に3回目	小6の 4月

### 予防接種スケジュールを立てるポイント



- ・ 接種可能な時期になったら、なるべく早く受けましょう。
- ・ かかりやすく重症化しやすい病気や流行している病気の予防接種を優先して受けましょう。
- ・ 複数回受けるものは、忘れずに予定を組みましょう。接種スケジュールを大きくはずれてしま  
うと接種回数や間隔が変わってくる場合がありますので、健康福祉課やかかりつけ医と相談し  
ましょう。

#### ◆◇他の種類の予防接種をする場合の間隔◇◆

生ワクチン(注射)後に他の生ワクチン(注射)をする場合は、27日以上の間隔をあけて  
接種します。接種間隔は、接種日の翌日を1日目としてかぞえます。

**生ワクチン(注射): BCG、麻しん風しん(MR)混合、水痘(水ぼうそう)、おたふくかぜなど**

経口生ワクチン、不活化ワクチン接種後に他の種類の予防接種をする場合は、間隔の制限は  
ありません。

- \* 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔がありますので、  
間違えないようにしましょう。
- \* 医師が必要と認めた場合は、2種類以上の予防接種を同時に接種することができます。

◆◇病気になった場合の間隔◇◆

麻しん（はしか）	…治ってから4週間程度あける
風しん・水ぼうそう・おたふくかぜなど	…治ってから2～4週間程度あける
突発性発疹・手足口病・伝染性紅斑（りんご病）	…治ってから1～2週間程度あける

\* 上記を参考に、接種の際はあらかじめかかりつけの医師に相談しましょう



町内指定医療機関

指定医療機関	住 所	電話番号（0877）
秋山医院	多度津町仲ノ町9番6号	32-8326
加藤病院	〃 寿町7番3号	33-2821
河内病院 ※1	〃 青木130-1	33-3113
嶋田耳鼻咽喉科	〃 幸町2番25号	32-8711
中野小児科医院	〃 道福寺13番5号	32-4532
三宅医院 ※2	〃 山階1386番地	32-5310
多度津三宅病院 ※3	〃 栄町2丁目1-36	32-2447
山本医院	〃 大通り5番11号	32-2809

※1 河内病院では、MR、水痘、日本脳炎、DT、子宮頸がんのみ接種できます。

※2 三宅医院では、MR2期、日本脳炎、DT、子宮頸がんのみ接種できます。

※3 多度津三宅病院では、子宮頸がんの接種はできません。

- \* 直接、接種予定の医療機関へ予約してください。
- \* 町外での接種を希望される場合は必ず、事前に下記まで連絡してください。  
(町外の香川県広域予防接種委託医療機関でも接種可能です)

多度津町健康福祉課

電話 0877-33-1134

