

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
65歳	S36.4.2～ S37.4.1 生	S37.4.2～ S38.4.1 生	S38.4.2～ S39.4.1 生	S39.4.2～ S40.4.1 生
70歳	S31.4.2～ S32.4.1 生	S32.4.2～ S33.4.1 生	S33.4.2～ S34.4.1 生	S34.4.2～ S35.4.1 生
75歳	S26.4.2～ S27.4.1 生	S27.4.2～ S28.4.1 生	S28.4.2～ S29.4.1 生	S29.4.2～ S30.4.1 生
80歳	S21.4.2～ S22.4.1 生	S22.4.2～ S23.4.1 生	S23.4.2～ S24.4.1 生	S24.4.2～ S25.4.1 生
85歳	S16.4.2～ S17.4.1 生	S17.4.2～ S18.4.1 生	S18.4.2～ S19.4.1 生	S19.4.2～ S20.4.1 生
90歳	S11.4.2～ S12.4.1 生	S12.4.2～ S13.4.1 生	S13.4.2～ S14.4.1 生	S14.4.2～ S15.4.1 生
95歳	S6.4.2～ S7.4.1 生	S7.4.2～ S8.4.1 生	S8.4.2～ S9.4.1 生	S9.4.2～ S10.4.1 生
100歳	T15.4.2～ S2.4.1 生	S2.4.2～ S3.4.1 生	S3.4.2～ S4.4.1 生	S4.4.2～ S5.4.1 生

ワクチン		標準的な接種間隔
9価ワクチン (シルガード)	14歳までに開始	2回接種：1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目を接種
	15歳以上で開始	3回接種：2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて、3回目を接種